

POSTREKY

Aktuality v chemickej ochrane záhradných plodín

Obdobie: 12.06.2015 - 18.06.2015

Plodina	Škodlivý činiteľ	Prípravok	Poznámky
broskyne	Klasterosporiôza (dierkovitosť listov a škvrnitosť listov)	EFUZINE 500 SC SYLLIT 65 WP	opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
čerešne višne	Vrtivka čerešňová	CALYPSO 480 SC DECIS EW 50 MOSPILAN 20 SP	prvý postrek poloskorých a neskorých odrôd na začiatku kvitnutia bazy čiernej v danej lokalite, druhý o dva týždne neskôr
hrušky	Méra hrušková		- prvý postrek dva týždne po odkvitnutí, ďalšie podľa potreby v 10-dňových intervaloch - proti škodcovi nie sú v súčasnosti v malospotrebitel'skom balení registrované žiadne prípravky; v zahraničí proti nej používajú prípravky Karate a Vertimec; ktoré sú u nás povolené na ošetrovanie jadrovín proti iným škodcom
jablone	Múčnatka jabloňová	KUMULUS WG TALENT THIOVIT JET TOPAS 100 EC ZATO 50 WG	opakované postreky náchylných odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí; pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované listové ružice a konce výhonkov
jablone hrušky	Chrastavitosť jadrovín	EFUZINE 500 SC SYLLIT 65 WP TALENT TOPAS 100 EC ZATO 50 WG	- opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami - postrekmi hrušiek proti chrastavitosti bojujeme aj proti hrdzi hruškovej
jablone hrušky	Obaľovač jablčný (1. generácia)	CALYPSO 480 SC DECIS EW 50 DIMILIN 48 SC BULLDOCK 25 EC INTEGRO KARATE ZEON 5 CS MOSPILAN 20 SP NURELLE D RELDAN 22 SPINTOR STEWARD	- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek prípravkami aplikovanými v čase kladenia vajíčok (Dimilin, Integro) aktuálny v najteplejších okresoch od 31. mája do 2. júna, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 3. do 5 júna, v severnejších oblastiach od 10. do 13. júna - ostatné prípravky sa aplikujú v čase hromadného liahnutia húseníc v najteplejších oblastiach od 7. do 10. júna, v ostatných južných oblastiach od 10. do 14. júna, v severnejších oblastiach od 17. do 24. júna
jahody	Botrytída (Sivá hniloba) jahôd	TELDOR 500 SC	postreky na začiatku kvitnutia a o 7 dní neskôr sú potrebné najmä v oblastiach s

			výdatnými dažďami
marhule	Klasterospori6za (dierkovitosť listov a škvrnitosť listov)	EFUZINE 500 SC SYLLIT 65 WP	opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
orech	Antrakn6za orecha Bakteri6za orecha	KUPRIKOL 50	opakované postreky náchylných stromov najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
ovocné dreviny	Vošky na ovocných drevinách	CALYPSO 480 SC DURSBAN 480 EC MOSPILAN 20 SP NEEMAZAL TS NURELLE D PYRINEX 48 EC RELDAN 22	- postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek
ovocné dreviny okrasné dreviny	štitnička morušová		- v týchto dňoch sa začalo liahnutie lariev jarnej generácie štitničky morušovej, preto treba dreviny, na ktorých sa našli štitky škodcu ošetriť dvakrát s 10-dňovým odstupom; - prípravky treba striedať - na ošetrovanie ovocných drevín sa môžu použiť napr. prípravky povolené proti voškám (neošetrovať rastliny krátko pred dozretím ovocia) - prípravky na ošetrovanie okrasných drevín sú uvedené pri okrasných rastlinách
vinič	Múčnatka viniča	BUMPER 25 EC CABRIO TOP DYNALI IQ CRYSTAL KUMULUS WG TALENT THIOVIT JET TOPAS 100 EC VIVANDO ZATO 50 WG	- prvý povinný preventívny postrek viniča tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí, ale najneskôr 14 dní po predchádzajúcom postreku - prípravky Cabrio a Zato sú účinné aj proti peronospóre
vinič	Peronosp6ra viniča	CABRIO TOP CUPROXAT SC CHAMPION 50 WP KOCIDE 2000 KUPRIKOL 50 PROFILER WG RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP TANOS 50WG ZATO 50 WG	- prvý povinný preventívny postrek viniča tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí, ale najneskôr 14 dní po predchádzajúcom postreku - prípravky Cabrio a Zato sú účinné aj proti múčnatke
cibuľa	Pleseň cibuľová	INFINITO KUPRIKOL 50 SIGNUM	opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami; do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Silwet)
paprika	Vošky na paprike	CALYPSO 480 SC DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS	postrek čo najskôr po zistení vošiek; uvedené prípravky sú účinné aj proti húseniciam

		MOSPILAN 20 SP PYRINEX 48 EC NURELLE D	
rajčiak	Fytoftóra rajčiakov	CUPROXAT SC CHAMPION 50 WP KOCIDE 2000 KUPRIKOL 50 RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP TANOS 50WG	- opakované preventívne postreky poľných porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami; - uvedené prípravky sú účinné aj proti septóriovej škvrnitosti listov rajčiakov a s výnimkou med'natých (Cuproxat, Champion, Kocide, Kuprikol) aj proti alternáριοvej škvrnitosti listov a plodov
zemiaky	Fytoftóra zemiakov	CURZATE GOLD CHAMPION 50 WP INFINITO KUPRIKOL 50 TANOS 50WG	opakované postreky poloskorých a neskorých odrôd zemiakov v 10 až 12-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
zemiaky	Pásavka zemiaková	CALYPSO 480 SC MOSPILAN 20 SP NEEMAZAL TS NURELLE D SPINTOR	prípravky sa aplikujú po vyliahnutí väčšiny lariev pásavky zemiakovej
Bršlen	štítňičky	CALYPSO AL DECIS AL DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS	opakované postreky napadnutých rastlín v desaťdňových intervaloch vždy iným prípravkom
Krušpán (Buxus)	vijačka krušpánová	CALYPSO AL DECIS AL DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS	postrek rastlín po zistení húseníc alebo ich požerkov na mladých výhonkoch
okrasné rastliny	Červce a Štítňičky na okrasných rastlinách Puklice	CALYPSO AL DECIS AL DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS	- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť - izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo na balkóne či na dvore; treba ich však chrániť pred priamym slnečným žiarením - Calypso AL a Decis AL - roztoky prípravkov určené na priame použitie
okrasné rastliny	Molica skleníková na okrasných rastlinách	CALYPSO 480 SC DECIS AL KARATE ZEON 5 CS	- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť - izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo na balkóne či na dvore; treba ich však chrániť pred priamym slnečným žiarením
okrasné rastliny	Múčnatka na okrasných rastlinách	FOLICUR AL KUMULUS WG THIOVIT JET	- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia múčnatky ich čo najskôr ošetriť
okrasné rastliny	Roztočce na okrasných rastlinách	APOLLO 50 SC VERTIMEC 018 EC	- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich

			čo najskôr ošetriť - izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo na balkóne či na dvore; treba ich však chrániť pred priamym slnečným žiarením
okrasné rastliny	Strapky na okrasných rastlinách	CALYPSO AL DECIS AL DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS VERTIMEC 018 EC	- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť - izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo na balkóne či na dvore; treba ich však chrániť pred priamym slnečným žiarením
okrasné rastliny	Vošky na okrasných rastlinách	BI 58 EC - NOVÉ CALYPSO AL DECIS AL KARATE ZEON 5 CS	- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť - izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo na balkóne či na dvore; treba ich však chrániť pred priamym slnečným žiarením
mečiky	Strapka mečíková	DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS VERTIMEC 018 EC	opakované postreky rastlín od výšky 20 cm v 10-dňových intervaloch s prídavkom zmáčadla (Silwet)
ruže	čierna škvrnitosť listov ruží	FOLICUR AL SYLLIT 65 WP	- opakované preventívne postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami - Folicur AL - roztok prípravku na priame použitie
ruže	Hrdza ružová	FOLICUR AL	opakované preventívne postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
			opakované preventívne postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
ruže	Vošky Piliarky na ružiach	DURSBAN 480 EC KARATE ZEON 5 CS	postrek čo najskôr po zistení uvedených škodcov